

Udskriftsdato: 15. december 2025

VEJ nr 9711 af 09/09/2014 (Historisk)

Vejledning til læger om gratis influenzavaccination

Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
Sundhedsstyrelsen, j.nr. 1-1210-164/1

Senere ændringer til forskriften

VEJ nr 10532 af 09/09/2015

Vejledning til læger om gratis influenzavaccination

Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper BEK 962 af 27/08/2014, fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I bekendtgørelsen er anført de persongrupper, der har ret til gratis vaccination, og der redegøres for honorering mv.

Alle, der tilhører en af de definerede risikogrupper i bekendtgørelsen, har ret til gratis vaccination. Med vejledningen ønsker Sundhedsstyrelsen at uddybe, hvilke personer med kronisk sygdom, der i særlig grad har behov for vaccination. For børn kan yderligere henvises til Dansk Pædiatrisk Selskabs retningslinjer for influenzavaccination af risikobørn.

WHO anbefaler, at minimum 75 % i risikogrupperne bliver vaccineret. En anbefaling som Sundhedsstyrelsen støtter. Desværre falder vaccinationsdækningen i Danmark blandt ældre. Mens vaccinationsdækningen blandt ældre danskere (65 år eller derover) i 2008 var 54 %, var den i 2013 kun 47 %.

Det skal understreges, at Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af så mange som muligt i risikogrupperne.

1. Persongrupper, der tilbydes gratis influenzavaccination

Af tabellen på næste side fremgår de risikogrupper der tilbydes gratis vaccination, samt Sundhedsstyrelsens supplerende bemærkninger hertil.

2. Indberetning af bivirkninger og skader

Bivirkninger

Af § 4 i bekendtgørelse nr. 381 af 09/04/2014 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler mm fremgår, at læger har pligt til at foretage indberetning af formodede bivirkninger til Sundhedsstyrelsen vedrørende patienter, de har i behandling.

Idet influenzavaccinationen har været markedsført længere end 2 år, omfatter indberetningspligten alle alvorlige eller uventede bivirkninger, som lægerne får formodning om hos patienter, de har vaccineret. Indberetningspligten omfatter således også uventede bivirkninger, der ikke er alvorlige. Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Sundhedsstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom. Patienter og pårørende samt andre sundhedspersoner end læger kan indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Skader

Af § 45 i lovebekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011, om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet fremgår, at det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning, at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringsforeningen.

3. Ikrafttræden

Denne vejledning træder i kraft den 1. oktober 2014 og har virkning for vaccinationer foretaget inden udgangen af 2014, dog for gravide og immunsupprimerede inden 28. februar 2015.

Nedenstående tabel viser de risikogrupper, der tilbydes gratis vaccination. Af venstre kolonne fremgår ordlyden i bekendtgørelsen, i højre kolonne Sundhedsstyrelsens supplerende bemærkninger.

Persongrupper der har ret til gratis influenza-vaccination, som anført i bekendtgørelse nr 962 af 27/08/2014	Sundhedsstyrelsens supplerende bemærkninger om personer der i særlig grad har behov for influenzavaccination
Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år	
Førtidspensionister	
Personer med kroniske lungesygdomme	Især personer med behandlingskrævende astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose samt andre lungesygdomme med nedsat lungefunktion eller gentagne lungeinfektioner
Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)	Især personer med svær koronarsygdom, inkomensation/ hjertesvigt, eller svær klaplidelse
Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)	Især personer med diabetes, som også har komplicerede hjerte- og/eller nyre lidelser
Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt	Herunder også HIV-smittede og medikamentelt immunsupprimerede personer, f.eks. i forbindelse med kemoterapi (vaccinér gerne i god tid før behandling påbegyndes for bedst mulig respons)
Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft	Herunder personer med f.eks. påvirket respiration pga. muskulære sygdomme, neuromuskulære sygdomme, spasticitet, og/eller diverse multihandicaps
Personer med kronisk lever- og nyresvigt	
Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko	Herunder personer med hæmoglobinopatier som seglcelle anæmi
Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering	
Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko	
Alle gravide i 2. og 3. trimester	Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis den gravide i øvrigt tilhører en risikogruppe
Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.	Tætte kontakter vaccineres for at beskytte patienter, hvis immunforsvar er så svækket, at de ikke vil have gavnlig effekt af vaccination.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 9. september 2014

SØREN BROSTRØM

/ Bolette Søborg